

PROFILAXIA DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV

Indicação de Zidovudina (AZT) e Nevirapina (NVP) no RN exposto

Cenários	Indicação	ARV	Posologia	Duração Total
Cenário 1	Uso de ARV no pré-natal e periparto, com carga viral documentada < 1.000 cp/ mL no 3º trimestre	AZT (VO)	- RN com 35 semanas ou mais de idade gestacional: 4 mg/kg/dose, de 12/12h. - RN entre 30 e 35 semanas de idade gestacional: 2 mg/kg/dose, de 12/12h por 14 dias e 3mg/kg/dose de 12/12h a partir do 15º dia. - RN com menos de 30 semanas de idade gestacional: 2mg/kg/dose de 12/12h.	4 semanas
Cenário 2	- Não utilização de ARV durante a gestação, independente do uso de AZT peri-parto OU - Uso de ARV na gestação, mas carga viral desconhecida ou ≥ a 1.000 cp/ml no 3º trimestre	AZT (VO) + NVP (VO)	- RN com 35 semanas ou mais de idade gestacional: 4 mg/kg/dose, de 12/12h. - RN entre 30 e 35 semanas de idade gestacional: 2 mg/kg/dose, de 12/12h por 14 dias e 3mg/kg/dose de 12/12h a partir do 15º dia. - RN com menos de 30 semanas de idade gestacional: 2mg/kg/dose, de 12/12h. - Peso ao nascimento > 2kg: 12 mg/dose (1,2 ml) - Peso ao nascimento 1,5 a 2kg: 8mg/dose (0,8 ml) - Peso ao nascimento <1,5 kg: não usar NVP	4 semanas 1ª dose: primeiras 48h de vida 2ª dose: 48h após 1º dose 3ª dose: dose 96h após a 2ª dose

Excepcionalmente, quando a criança não tiver condições de receber o medicamento por Via Oral ou Sonda Enteral, pode ser utilizado o AZT injetável nas seguintes doses:

- **Recém-nascido com 35 semanas ou mais de idade gestacional:** 3mg/kg IV 12/12h
- **Recém-nascido entre 30 e 35 semanas de idade gestacional:** 1,5mg/kg IV 12/12h nos primeiros 14 dias de vida e 2,3 mg/kg/dose de 12/12h a partir do 15º dia.
- **Recém-nascido com menos de 30 semanas de idade gestacional:** 1,5mg/kg IV 12/12h

Neste caso não se associa a nevirapina, mesmo quando indicada, pois só está disponível em apresentação oral.