

# TACROLIMO - IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE RENAL

1 mg e 5 mg – cápsula

Portaria SAS/MS nº 712, de 13 de agosto de 2014 (Protocolo na íntegra)

## Informações

CIDs: T86.1, Z94.0

Quantidade máxima mensal: 1 mg – 930 cápsulas / 5 mg – 248 cápsulas

Grupo de Financiamento: 1A

## Documentação Necessária

### 1º Solicitação

1. Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
3. Cópia de documentos pessoais do paciente
  - Documento de identidade;
  - Comprovante de residência com CEP;
  - Cartão Nacional de Saúde (CNS).
4. Cópia dos exames:
  - Não são exigidos exames de diagnóstico inicial, porém, o médico prescriptor deverá descrever no campo “anamnese” do LME (Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) a data do transplante se doador vivo (HLA idêntico ou distinto) ou falecido e a condição clínica do transplantado frente ao tratamento imunossupressor atualmente empregado, bem como os medicamentos já utilizados.

A critério do médico prescriptor:

Para rejeição aguda celular:

- Dosagem sérica – creatinina.

Para rejeição aguda mediada por anticorpos:

Pesquisa anticorpo anti-HLA (Antígeno Leucocitário Humano);

- Biópsia renal.

Para rejeição crônica:

Dosagem sérica – creatinina;

- Ultrassonografia e doppler colorido da vasculatura do enxerto;
- Biópsia renal.

5. Termo de Esclarecimento e Responsabilidade

# Renovação

1. Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (trimestralmente).
2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (trimestralmente).
3. Cópia dos exames:

A critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica – fármaco;
- Hemograma;
- Glicemia de jejum;
- Dosagem sérica – creatinina;
- Dosagem sérica – colesterol total;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica – triglicerídeos;
- Dosagem sérica – LDL;
- Dosagem sérica – sódio;
- Dosagem sérica – potássio;
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

TACROLIMO - Imunossupressão no Transplante Renal

Alterado em 26/08/2019