

DESFERROXAMINA - Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica

500 mg – frasco-ampola

Portaria SAS/MS nº 801, de 25 de abril de 2017 (Protocolo na íntegra)

Informações

CIDs: E83.3, N18.0, N25.0

Quantidade máxima mensal: 372 frascos-ampola

Grupo de Financiamento: 1B

Documentação Necessária

1º Solicitação

1. Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
3. Cópia de documentos pessoais do paciente
 - Documento de identidade;
 - Comprovante de residência com CEP;
 - Cartão Nacional de Saúde (CNS).
4. Cópia dos exames:
 - Teste para diagnóstico de excesso de alumínio;
 - Alumínio sérico;
 - Laudo informando sinais e sintomas clínicos de intoxicação por alumínio;
 - Laudo informando se paciente realizou paratireoidectomia;
 - Para tratamento da intoxicação alumínica:
 - Alumínio sérico;
 - Biópsia óssea;
 - Laudo médico informando sintomas de intoxicação alumínica
 - Taxa de filtração glomerular OU creatinina sérica
 - Descrição clínica informando se o paciente realiza terapia renal substitutiva
 - Avaliações oftalmológicas e otorrinolaringológicas
5. Termo de Esclarecimento e Responsabilidade preenchido e assinado pelo médico responsável.

Renovação

1. Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original preenchido de forma completa e legível pelo médico oftalmologista responsável pelo atendimento ao paciente (trimestralmente).
2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (trimestralmente).
3. Cópia dos exames
 - 3 determinações de alumínio sérico realizados após 3 testes consecutivos
 - Laudo médico informando possíveis efeitos colaterais observados durante o teste diagnóstico
 - Avaliações oftalmológicas e otorrinolaringológicas