

Ácido Ursodesoxicólico - Colangite Biliar Primária

comprimido de 50 mg, 150 mg e 300 mg

PORTARIA CONJUNTA Nº 11, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

Informações

CID: K74.3

Dose: 13 mg a 15 mg/kg/dia, via oral, dose única ou dividida em até quatro doses diárias.

Documentação Necessária

1º Solicitação

1. Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
3. Cópia de documentos pessoais do paciente
 - Documento de identidade;
 - Comprovante de residência com CEP;
 - Cartão Nacional de Saúde (CNS);
 - CPF.
4. Paciente deve preencher pelo menos, 2 de 3 dos seguintes critérios diagnósticos:
 - Elevação de enzimas colestáticas, especialmente da FA ou GGT.
 - Presença de anticorpos antimitocondriais (AAM) ou anticorpo antinúcleo (AAN) positivo.
 - Evidência histológica de **colangite destrutiva não-supurativa** através de colangioproressonância ou colangiopancreatografia retrógrada (via endoscópica). Se esses exames forem normais, faz-se biópsia do fígado.
5. Termo de esclarecimento e responsabilidade (página 16 do link:
<http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Portaria-Conjunta-PCDT-Colangite-Biliar-SAES.pdf>).

Renovação

1. Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (trimestralmente).
2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico oftalmologista responsável pelo atendimento ao paciente (trimestralmente).
3. Não são exigidos exames de monitoramento.