

METOTREXATO - Doença de Crohn

25 mg/mL – injetável, ampola de 2 ml

Portaria Conjunta nº 14, de 28 de novembro de 2017 (Protocolo na íntegra)

Informações

CIDs: K50.0, K50.1, K50.8

Quantidade máxima mensal:

Tratamento de indução de remissão: 25 mg por semana, intramuscular, de 7 em 7 dias.

Tratamento de manutenção de remissão: 12,5 a 25 mg por semana, intramuscular, de 7 em 7 dias.

Grupo de Financiamento: 1A

Documentação Necessária

1º Solicitação

1. [Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica](#) original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
3. Cópia de documentos pessoais do paciente
 - Documento de identidade;
 - Comprovante de residência com CEP;
 - Cartão Nacional de Saúde (CNS).
4. Cópia dos exames:
 - Laudo endoscópico, radiológico, cirúrgico ou anatomopatológico;
 - Pontuação do Índice de Harvey-Bradshaw (IHB);
 - Hemograma com plaquetas;
 - TGO;
 - TGP;
 - Fosfatase alcalina;
 - Creatinina sérica;
 - Beta-HCG sérico (mulheres em idade fértil).

5. [Termo de Esclarecimento e Responsabilidade](#)

Renovação

1. [Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica](#) original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (trimestralmente).
2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (trimestralmente).
3. Cópia dos exames:
 - Pontuação do Índice de Harvey-Bradshaw (IHB);
 - Hemograma com plaquetas;
 - Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
 - Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
 - Dosagem sérica – creatinina;
 - Dosagem sérica – fosfatase alcalina.