

SULFASSALAZINA - Espondilite Ancilosante

500 mg – comprimido

Portaria SAS/MS/SCTIE nº 07, de 17 de julho de 2017 (Protocolo na íntegra)

Informações

CIDs: M45, M46.8

Quantidade máxima mensal: 372 comprimidos

Grupo de Financiamento: 2

Documentação Necessária

1º Solicitação

1. [Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica](#) original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.

2. Receita de Controle Especial em duas vias ou Receituário Simples em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente

3. Cópia de documentos pessoais do paciente

- Documento de identidade;
- Comprovante de residência com CEP;
- Cartão Nacional de Saúde (CNS).

4. Cópia dos exames:

- Descrição detalhada dos sinais e sintomas de espondiloartrite apresentados pelo paciente e tempo de duração dos mesmos
- Descrição dos tratamentos prévios realizados e tempo de uso
- Escore BASDAI ou ASDAS
- Escala Visual Analógica (EVA) de dor
- VSG
- Proteína C reativa
- Hemograma com plaquetas
- TGO/AST
- TGP/ALT
- Depuração da creatinina endógena
- radiografia de tórax
- anti-HCV
- HbsAg

PACIENTES COM ATÉ 45 ANOS

- HLA-B27 ou laudo de exame de imagem que evidencie sacroilíte

PACIENTES COM 45 ANOS OU MAIS

- Laudo de exame de imagem que evidencie sacroilíte

5. [Termo de Esclarecimento e Responsabilidade](#)

Renovação

1. Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (trimestralmente).
2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (trimestralmente).
3. Cópia dos exames:
Trimestralmente:
 - Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
 - Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
 - Hemograma com contagem de plaquetas;
 - Dosagem sérica – creatinina.
A critério do médico prescritor:
 - Escala BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index).
 - VHS (Velocidade de Hemossedimentação);
 - Dosagem sérica – PCR (Proteína C Reativa).

SULFASSALAZINA - Espondilite Ancilosante

Alterado em 30/08/2019